

F1 मीरची

खाद अनुसूची



रोपाई के बाद के दिन	खाद	डोज / दिन / एकड़	खाद की मात्रा / एकड़
बेसल डोज	सिंगल सुपर फॉस्फेट सल्फर नीम केक (M O P (सफ़ेद रंग))	२०० किलो ३ किलो १०० किलो १०० किलो	
3 से 30 दिन	मैग्नीशियम सल्फेट यूरिया 19:19:19 बोरॉन 20%	२०० ग्राम ४०० ग्राम २ किलो ४०० ग्राम	५.४ किलो १०.८ किलो २७ किलो 20वें दिन एक बार दें
31 से 60 दिन	यूरिया 12:61:00 M O P (सफ़ेद रंग) मैग्नीशियम सल्फेट बोरॉन 20% कैल्शियम नाइट्रेट	४०० ग्राम ६०० ग्राम ८०० ग्राम ४०० ग्राम ४०० ग्राम	१८ किलो १२ किलो २१ किलो १२ किलो 60 वें दिन एक बार दें 40वें दिन एक बार 5 किलो देना चाहिए।
61 से 90 दिन	यूरिया 12:61:00 M O P (सफ़ेद रंग) मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन 20%	१.६ किलो ५०० ग्राम १.२ किलो ६०० ग्राम ४०० ग्राम	४८ किलो ९ किलो ३६ किलो १८ किलो 80 वें दिन एक बार 5 किलो देना चाहिए। ९० वें दिन एक बार दें
91 से 120 दिन	अमोनियम सल्फेट यूरिया 0:52:34 कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन 20% मैग्नीशियम सल्फेट	१.५ किलो २ किलो १ किलो ४०० ग्राम ६०० ग्राम	४५ किलो ६० किलो ३० किलो 100वें दिन एक बार दान करें 110वें दिन एक बार दान करें
121 से 180	अमोनियम सल्फेट M O P (सफ़ेद रंग) 13:00:45	२.५ किलो ६०० ग्राम ६०० ग्राम	७५ किलो १८ किलो १८ किलो

दिन में अवधि	छिड़काव	डोज / लीटर पानी
४ दिन की सिंचाई	क्लोरो २०% + ह्यूमिक + स्टिकर	५०० मिली + ५०० ग्राम + १०० मिली/एकर
१० दिन	थायोमैथोक्साम २५% + कार्बेन्डिथ्राम + मॅन्कोझेब + स्टिकर	१ ग्राम + २ ग्राम + ०.५ मिली
१५ दिन	नीम अंडल	२ मिली
२० दिन	किटोगॉर्ड + सिलिकॉन	१.५ मिली + २ मिली
२८ दिन	एसीटांमिड २०% + हेक्साकोनाडोल ४% + झिनेब ६८% डब्ल्यूपी + कासु-बी	१ ग्राम + २ ग्राम + ३ मिली
३५ दिन	किटोगॉर्ड + सिलिकॉन	१.५ मिली + २ मिली
४० दिन	नोर्कॅल्सुरॉन १०% + मेटॅलॅक्सिल ८% डब्ल्यूपी + मॅन्कोझेब ६४% + स्टिकर	२ मिली + २ ग्राम + ०.५ मिली
४३ दिन	अमिनो ऍसिड ८०% + ग्रेड २ + १२:६१:००	२ मिली + १ ग्राम + ३ ग्राम
४८ दिन	५०% फ्लोनिक्वामिड, + ऑक्झीक्सीस्ट्रोबिन ८.३% & मॅन्कोझेब ६६.७% + स्टिकर	१ ग्राम + २ ग्राम + १ मिली

दिन में अवधि	छिड़काव	डोज / लीटर पानी
५५ वा दिन	फ्लिनोसॅड ४४.०३% + डायफेन्कोनाझोल २५% ईसी + समुद्री शैवाल अर्क	२ मिली + २ मिली + २ मिली
६० वा दिन	चेलेटेड कैल्शियम + बोरॉन २०%	१ ग्राम + १.५ ग्राम
६५ वा दिन	किटोगॉर्ड + सिलिकॉन	१.५ मिली + २ मिली
७० वा दिन	इमामेक्विन बेंडोफ्लेन ५% + ग्रेड २ + अमिनो आम्ल ८०%	१ ग्राम + १.५ ग्राम + २ मिली
७५ वा दिन	फिप्रोनिन ४०% + मेटॅलॅक्सिल ८% डब्ल्यूपी + मॅन्कोझेब ६४% + स्टिकर	२ मिली + ३ ग्राम + ०.५ मिली
८० वा दिन	चेलेटेड कैल्शियम + बोरॉन २०%	१ ग्राम + १.५ ग्राम
८२ वा दिन	कॅलिऑरॉप + स्टिकर	२ ग्राम + ०.५ मिली
९० वा दिन	४कोराजेन + मेटॅलॅक्सिल ८% डब्ल्यूपी + मॅन्कोझेब ६४% + स्टिकर	०.५ मिली + २ ग्राम + ०.५ मिली
९८ वा दिन	डायनोस्पूरन २०% एसजी + कार्बेन्डिथ्राम ५०% + १३:००:४५	१ ग्राम + २ ग्राम + ३ ग्राम

नोट: ऊपर दी गई जानकारी हमारे रिसर्च सेंटर में किए गए एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। यह जगह, मौसम, मिट्टी के प्रकार और मौसम जैसे फैक्टर्स के आधार पर अलग हो सकती है।